



Νέο!

klorexivet[®]
SPRAY

Αποηυμαίνει και προστατεύει
σαν δεύτερο δέρμα



Συστατικά και ωφέλη

klorexivet



ΕΘΑΝΟΛ

Άμεση
αντισηψία

+

MENTHOL

Αντισηπτικό και αναλγητικό με ψυκτική δράση, παρέχοντας αίσθηση φρεσκάδας και ανακούφισης

THYMOL

+

CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE (2%)

Αντισηψία
μακράς διάρκειας



FILMOGEN POLYMERS

Αυτά τα πολυμερή δημιουργούν ένα προστατευτικό φιλμ πάνω από την πληγή, έτσι ώστε όταν το οινόπνευμα εξατμίζεται, η μεμβράνη παραμένει στο δέρμα ενώ τα άληθα ενεργά συστατικά αρχίζουν να δρουν.

Καινοτόμος Σύνθεση σε Spray που δημιουργεί προστατευτικό Βιοφίλμ

ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΠΛΗΓΕΣ στα κατοικίδια χάρη στην αντισηπτική δράση.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ για επούλωση και αποτρέπει τον πολλαπλασιασμό μικροβίων στην πληγή.

ΒΟΗΘΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΑΣΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ δημιουργώντας ένα προστατευτικό βιοφίλμ.

ΠΙΚΡΗ ΓΕΥΣΗ αποτρέπει τα κατοικίδια να γλείφουν την πληγή.



ΑΜΕΣΗ και ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ προστασία, ανακούφιση και αποψύμανση

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ψεκάστε σε απόσταση 10-12εκ.



ΔΡΑΣΗ

Αποψύμανση



ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Σε κίνηση Σε ηρεμία




ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ


Πικρή γεύση




ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



ΔΙΑΦΑΝΕΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΒΙΟΦΙΛΜ



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ του Klorexivet Spray



1

ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ

- ΜΕΣΟΔΑΚΤΥΛΙΑ ΔΟΘΙΗΝΩΣΗ (κύστες)
- ΠΟΔΟΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ
- ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ ΤΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΟΥ ΑΙΔΟΙΟΥ
- ΠΕΡΙΠΡΩΚΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ
- ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ ΤΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΛΕΩΝ
- ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ ΤΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΗΣ ΟΥΡΑΣ

2

ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ

- **PYODERMAS:** principally useful for the abdominals.
- **CLAW/NAIL** infections.
- **INTERTRIGO.**

3

ΑΓΚΩΝΕΣ

- **CRACKS/SKIN EROSIONS:**
common in the joints for example.
- **FOOTPADS:**
cuts; vasculitis, leishmaniasis, burns.
- **BURNS:**
as long as the skin has not started peeling in the first states (3-5 days).
- **SURGERIES:**
unopened surgical wounds.
- **TRAUMATISMS.**



4

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

- **APPLICATION ON CATHETERS, STOMAS**
- **ANIMAL ICU**
 - Surgical incisions.
 - Closed wounds.
- **MULTIPLE INJURIES:**
apply on wounds until they can be treated.
- **SKIN AROUND THE WOUND:**
prevent the wound from spreading.





Συσκευασία:
30 ml ή 100 ml εύχρηστου σπρέι
εφαρμογή από τον ιδιοκτήτη ή τον κτηνίατρο

Αποημιάει και προστατεύει σαν δεύτερο δέρμα

Chlorhexidine digluconate 2% · Menthol · Thymol · Ethanol

Συστατικά:

Κάθε πιπέτα περιέχει:

- Διγλυκονική χλωρεξιδίνη20 mg/g
- Αιθανόλη (διαλύτης)
- Μέντα
- Θυμόλη

Ειδικές οδηγίες φύλαξης:

Να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Περιγραφή:

Το KLOREXIVET® διαθέτει μια καινοτόμο φαρμακευτική φόρμουλα που βοηθά ένα φιλμ να σχηματιστεί πάνω από την πληγείσα περιοχή το οποίο λειτουργεί σαν προστατευτικό φράγμα και αυτό βοηθά στη βελτίωση της δραστηριότητας της χλωρεξιδίνης. Αυτό βοηθά στη χρήση μικρότερων ποσοτήτων προϊόντος και προστατεύει την περιοχή του τραύματος , σχηματίζοντας μια βιοσυγκολλητική μεμβράνη.

Το KLOREXIVET® διατηρεί την πληγή του ζώου καθαρή και την προστατεύει χάρη στην αντισηπτική του δράση. Μόλις αντιμετωπιστεί η πληγή, δημιουργεί το σωστό περιβάλλον για επούλωση και αποτρέπει την μικροβιακή υπερανάπτυξη στην πληγή.

Η αιθανόλη έχει μια επιπλέον αντισηπτική δράση εκτός από τη χλωρεξιδίνη, που είναι βραχύβια. Επιπλέον, η μενθόλη και η θυμόλη έχουν αντισηπτική και αναλγητική δράση με ένα επιπλέον ψυκτικό αποτέλεσμα, ανακουφίζοντας από τον πόνο.

Συνιστώμενη χρήση:

Γάτες και σκύλοι με επιφανειακούς τραυματισμούς, όπως πχ στις ακόλουθες καταστάσεις:

- Δερματίτιδα: διεγνητική φουρουλίωση (κύστεις), ποδοδερματίτιδα: φλεγμονή του δέρματος που μπορεί να επηρεάσει τους διαγεννητικούς χώρους, πατούσες και τα νύχια, δερματίτιδα, περινιακή δερματίτιδα, περι-προεγκατεστημένη δερματίτιδα.
- Λοιμώξεις του δέρματος: πυόδερμα, λοιμώξεις των νυχιών, intertrigo.
- Πληγές: ρωγμές ή πληγές, περικοπές σε μαξιλιάρια, αγγειίτιδα, ριζομανίαση, εγκαύματα (τις πρώτες 3-5 ημέρες), μη ανοικτά χειρουργικά τραύματα, τραυματισμοί τραυματικής περιοχής.
- Προστασία: χρησιμοποιείται για καθήρες, οστομίες, ζώα ICU (χειρουργικές τομές, κλειστά τραύματα), τραυματισμοί με πολλαπλά τραύματα, δέρμα γύρω από πληγές.

Συνιστούμε να διακόψετε τη χρήση μόλις επιτευχθεί το τελικό στάδιο επούλωσης των πληγών.

Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:

Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση και ψεκάστε πάνω από την πληγή από μια απόσταση 10-12 cm. Μην αγγίζετε για τουλάχιστον 2 λεπτά μετά την εφαρμογή ώστε να επιτρέψετε στο βιοσυγκολλητικό φιλμ να σχηματιστεί.

Ψεκάστε πλούσια (2-3 φορές ανά 5 cm τραυματισμένης περιοχής) στην προσβεβλημένη περιοχή 2 ή 3 φορές την ημέρα. Μετά από μια μακρά περίοδο μη χρήσης της φιάλης KLOREXIVET®, ανακινήστε τη φιάλη ή ψεκάστε αρκετές φορές διαδοχικά μέχρι να εμφανιστεί το προϊόν.

Μπορεί να ψεκαστεί σε βλεννογόνους και στο εξωτερικό αυτί. Μην το ψεκάζετε στα μάτια. Εάν ψεκαστεί στα μάτια, ξεπλύνετε το προϊόν με άφθονο νερό.

Το KLOREXIVET® έχει μικρή γεύση που αποθαρρύνει τα κατοικίδια να γλείφουν την πληγή, γεγονός που βοηθά να προσκολλητάι περισσότερο χρόνο στην περιοχή όπου εφαρμόζεται.