



Εύγευστα ενδοπαρασιτοκτόνα για σκύλους

#### ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Κάθε δισκίο περιέχει:

Πραζικουαντέλη 50 mg  
Εμβονική πυραντέλη 144 mg

Φαιβαντέλη 150 mg

Κτηρινώπα στρογγυλά δισκία με καφέ κουκκίδες. Τα δισκία μπορούν να διαιρεθούν σε δύο ή/και σε τέσσερα ίσα μέρη.

#### ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ):

Για την αντιμετώπιση των μικτών παρασιτώσεων από τους ακόλουθους έλιμνιθες και κεστώδη σε σκύλους και κουτάβια: Ασκαρίδες Toxocara canis, Toxascaris leonina (ενήλικες και ώψιμες άρρενες μορφές). Αγκυλοστόματα: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (ενήλικες). Κεστώδη: Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp., Multiceps multiceps (ενήλικες και άρρενες μορφές).

#### ΑΝΤΕΝΔΙΞΕΙΣ:

Να μη χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με ενώσεις πιπεραζίνης. Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευασθησίας στα δραστικά συστατικά ή σε κάποιο από τα έκδοxa.

#### ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Εάν παρατηρήσεται οποιαδήποτε συμβάρη ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνιάτρο σας.

#### ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Σκύλοι.

#### ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Από τον στόματος χρήση.

#### Δοσολογία

Οι συνιστώμενες δοσολογίες είναι: 15 mg φαιβαντέλη, 14,4 mg εμβονική πυραντέλη και 5 mg πραζικουαντέλη ανά κιλό σωματικού βάρους. Αυτό είναι ισοδύναμο με 1 δισκίο ανά 10 κιλά σωματικού βάρους.

Εάν απαιτείται, τα δισκία μπορούν να διαιρεθούν σε δύο/τέσσερα ίσα μέρη.

Για παραδίγμα, ένας σκύλος που ζυγίζει

- 2,5 κιλά σωματικό βάρος λαμβάνει ¼ του δισκίου
- 5,0 κιλά σωματικό βάρος λαμβάνει ½ του δισκίου
- 10 κιλά σωματικού βάρους λαμβάνει 1 δισκίο
- 15 κιλά σωματικού βάρους λαμβάνει 1½ δισκίο
- 20 κιλά σωματικού βάρους λαμβάνει 2 δισκία
- 30 κιλά σωματικού βάρους λαμβάνει 3 δισκία

κ.λ.π.

Τα κουτάβια θα πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία στην ηλικία των 2 εβδομάδων και κάθε 2 εβδομάδες μέχρι την ηλικία των 12 εβδομάδων. Κατόπιν, θα πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία σε διαστήματα των 3 μηνών. Συνιστάται να παρέχεται θεραπεία στη μπέρη την ίδια περίοδο με τα κουτάβια. Δεν προορίζεται για χρήση σε σκύλους που ζυγίζουν λιγότερο από 2,5 κιλά.

Για έλεγχο ρουτίνας, ο ενιλίκοι σκύλοι θα πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία κάθε 3 μήνες. Για αντιμετώπιση ρουτίνας, συνιστάται μία εφ' άποξ δόση. Στην περίπτωση βαριάς παρασίτωσης από έλιμνιθες, θα πρέπει να επαναληφθεί η χορήγηση δόσης μετά από 14 ημέρες.

#### ΟΛΗΠΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Για να διασφαλίσετε τη χορήγηση της σωστής δόσης, το σωματικό βάρος πρέπει να καθοριστεί με όσο το δυνατότερο ακρίβεια. Τα δισκία μπορούν να χορηγηθούν απ' ευθείας στο σκύλο ή κρυμμένα στην τροφή του. Δεν απαιτείται νηστεία πριν ή μετά τη θεραπεία. Εάν υπάρχει κίνδυνος για νέα παρασίτωση, θα πρέπει να ζητηθεί η συμβουλή ενός κτηνιάτρου σχετικά με την ανάγκη και τη συνχότητα της επανάληψης της χορήγησης.

#### ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν ισχύει.

#### ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δε βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Το εν λόγω κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες για τη φύλαξή του.

Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί. Επιστρέψει οποιοδήποτε μερικό δισκίο στην ανοιγμένη συσκευασία blister.

Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοικεώδους συσκευασίας: 15 ημέρες Διάρκεια ζωής μετά τη διαίρεση του δισκίου στα δύο ή στα τέσσερα: 15 ημέρες

#### ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Ειδική προειδοποίηση(εις) για κάθε είδος στόχο

Οι ψύλλοι δρουν ως ενδιάμεσοι ξενιστές για έναν κοινό τύπο κεστωδών – Dipylidium caninum. Είναι βέβαιο ότι ο παρασίτωση από κεστώδη θα επανεμφανιστεί, εάν δεν καταπολεμηθούν οι ενδιάμεσοι ξενιστές, όπως ψύλλοι, ποντίκια, κ.τ.λ.. Η παρασίτωση από κεστώδη δεν είναι πιθανό σε κουτάβια πληκίας κάτω των 6 εβδομάδων. Η παρασίτηκη αντίσταση σε οποιαδήποτε τάξη ανθελμινθικών μπορεί να αναπτυχθεί κατόπιν συχνής, επανειλημμένης χρήσης ενός ανθελμινθικού της συγκεκριμένης τάξης.

Προειδοποίησης για την χρήση

Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρχει κατάποση, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος. Μετά τη χρήση, να πλένετε τα κέρια σας.

Χρήση κατά την κύπη, τη γαλουχία ή την ωστοκία

Έχουν αναφερθεί τερατογόνες επιδράσεις που οφείλονται σε υψηλές δόσεις φαιβαντέλης σε πρόβατα και αρουραίους. Δεν έχει διεξαχθεί καμία μελέτη σε σκύλους κατά τη διάρκεια πρώτης κύπης. Η χρήση του προϊόντος κατά τη διάρκεια της κύπης θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την αξιολόγηση των οφελών και κινδύνων από τον υπεύθυνο κτηνιάτρο. Η χρήση του προϊόντος δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια των πρώτων 4 εβδομάδων της κύπης. Μην υπερβαίνετε τη δολωμένη δόση όταν παρέχετε θεραπεία σε θηλυκούς σκύλους που κυοφορούν.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπιδράσης

Η σύγχρονη χρήση με άλλες κολινεργικές ενώσεις μπορεί να δηγυγήσει σε τοξικότητα. Η επίδραση των δραστικών συστάσης με τη δραστικότητα της εστεράσης της ακετυλοχολίνης (π.χ. οργανωφαροεικές ενώσεις) μπορεί να αυξήσει. Οι συγγεκριμένες ιδιότητες της πιπεραζίνης (νευρομυϊκή παράλυση των παράσιτων) μπορεί να ανταγωνιστεί την επίδραση της πιπεραζίνης (σπαστική παράλυση των παράσιτων).

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητη Ο συνδυασμός της πραζικουαντέλης, εμβονικής πυραντέλης και φαιβαντέλης είναι καλά ανεκτός σε σκύλους. Σε μελέτες ασφάλειας, μία εφ' άποξ δόση που ήταν 5 φορές μεγαλύτερη της συνιστώμενης δόσης ή υψηλότερη προκάλεσε περιστασιακό έμετο.

Ασυμβατότητες

Δεν ισχύει.

#### ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Κάθε μη χρησιμοποιηθέντων κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμωνά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ιατούσες εθνικές απαιτήσεις. Συμβουλευθείτε τον κτηνιάτρο σας για τον τρόπο απορρίψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

#### ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

3365/19-01-2015

#### ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χόρτινα κουτί που περιέχει 1 συσκευασία blister

από αλουμίνιο PVC/PVDC των 2 δισκών

Χόρτινα κουτί που περιέχει 1 συσκευασία blister

από αλουμίνιο PVC/PVDC των 10 δισκών

Χόρτινα κουτί που περιέχει 2 συσκευασίες blister

από αλουμίνιο PVC/PVDC των 10 δισκών, με συνολικά 20 δισκία.

Χόρτινα κουτί που περιέχει 1 συσκευασία blister

από αλουμίνιο PVC/PVDC των 10 δισκών, με συνολικά 50 δισκία.

Χόρτινα κουτί που περιέχει 10 συσκευασίες blister

από αλουμίνιο PVC/PVDC των 10 δισκών, με συνολικά 100 δισκία.

Χόρτινα κουτί που περιέχει 30 συσκευασίες blister

από αλουμίνιο PVC/PVDC των 10 δισκών, με συνολικά 300 δισκία.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος: PETLINE A.E.

Φίνος Φίλμ, Θέση Χούσμιζα, Σπάτα 19004, 210 60 69 800


Ειδικοί Συνεργάτες: ANICELL O.E.

Λ. Δημοκρατίας 257, Αχαρνές, Αθήνα 13671, 211 411 0 700



# wellplus®

Εύγευστα ενδοπαρασιτοκτόνα για σκύλους



## ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:

2,5 kg	<input type="checkbox"/>
5 kg	<input checked="" type="checkbox"/>
10 kg	<input type="checkbox"/>



- Συνδυασμένη δράση 3 δραστικών ουσιών (πραζικουαντέλη, πιραντέλη, φαιβαντέλη) για την καταπολέμηση μεγαλύτερου φάσματος ενδοπαρασίτων.
- Δισκία διαιρούμενα σε 2 ή 4 ίσα μέρη για προσαρμογή σε όλα τα δοσολογικά σχήματα.
- Μπορεί να χορηγηθεί ανεξάρτητα από τα γεύματα.
- Εύγευστα δισκία για ευκολότερη πρόσληψη.



ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ